



Эмоции в полный голос!

- Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой полости рта, десен и гортани
- Широкий спектр воздействия на причины проблем в полости рта
- Разрешен для беременных и кормящих матерей
- Разрешен для детей с 3 лет



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЗОТТ®

Регистрационный номер: ЛП-006981. **Торговое наименование:** ЗОТТ®. **Группировочное наименование:** лизоцим + пиридоксин. **Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания. **Состав:** действующие вещества: лизоцима гидрохлорид – 20,00 мг; пиридоксина гидрохлорид – 10,00 мг. **Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство. **Код АТХ:** [R02AA20]. **Показания к применению:** лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** препарат ЗОТТ® может применяться во время беременности и в период грудного вскармливания. **Способ применения и дозы:** препарат применяется местно. Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше, до полного растворения. Детям в возрасте 3–7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки, 7–12 лет – по 1 таблетке 4 раза в сутки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет – по 2 таблетки 3–4 раза в сутки. Курс лечения 8 дней. **Побочное действие:** аллергические реакции; ангионевротический отек (отек Квинке), крапивница, бронхоспазм, очень редко – мультиформная экссудативная эритема. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** без рецепта.



GOOD PEOPLE
for GOOD HEALTH

ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»

Россия, 127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609

тел./факс +7 (495) 642-82-35, тел. +7 (495) 642-82-35

Антисептическое средство при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний слизистых рта, десен и гортани^{1,2}

лизоцима гидрохлорид – 20,00 мг
lysozyme hydrochloridum – 20.00 mg

пиридоксина гидрохлорид – 10,00 мг
pyridoxinum hydrochloridum – 10.00 mg



Таблетки рекомендуют	Курс лечения 8 дней		
<ul style="list-style-type: none"> • Медленно рассасывать • Не разжевывать • После растаивания задерживать в полости рта как можно дольше, до полного растворения 	3 года – 7 лет	7–12 лет	старше 12 лет
	3 раза в сутки 	4 раза в сутки 	3–4 раза в сутки 

Показание к применению

Острые и хронические бронхолегочные заболевания с затруднением отхождения мокроты	Код МКБ-10
Гингивит и болезни пародонта	K05
Стоматит и родственные поражения	K12
Острые инфекции верхних дыхательных путей	J06
Герпетические поражения (в комплексной терапии)	B00.9
Эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии	K13.7

Результат комплексного воздействия лизоцим + пиридоксин – повышение устойчивости к респираторным инфекциям²

¹ Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЗОТТ® ЛП-006981.

² Саутиева М.М. Естественная защита дыхательных путей от бактерий и вирусов // Фармацевтический вестник. 2011. № 6 (622).

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Не является индивидуальной рекомендацией. Материал носит информационный характер. Перед применением требуется консультация со специалистом.